

I 임상지표



류마티스관절염

01 류마티스관절염 항류마티스약제 처방율

> 지표 설명


류마티스관절염 환자 중 항류마티스제를 처방 받은 환자의 비율을 말합니다.

※ 류마티스관절염 : 자가면역 질환의 일환으로, 다양한 면역세포가 혈액 속에서 관절의 활막으로 몰려가 쌓이면서 지속적인 염증을 유발하는 질환

> 지표결과

대상기간 : 2022년 ~ 2023년

단위 : %



• 자료출처 : 인하대병원 전자의무기록

류마티스관절염의 치료 목표는 염증을 조절하고 관절이 손상되는 것을 예방하는 것입니다. 전신을 침범할 수 있어 빠른 시일 내에 진단받고 관리하는 것이 무엇보다 중요합니다.

발병 후 1~2년 내에 관절이 손상되기 때문에 조기에 항류마티스약제를 시작해야 하며, 질병활성도를 모니터링하여 치료법을 조절해야 합니다.

02 류마티스관절염 엽산 처방율


> 지표 설명

MTX(메토트렉세이트)를 처방 받은 류마티스관절염 환자 중에서 엽산을 함께 처방 받은 환자의 비율을 말합니다.

> 지표결과

대상기간 : 2022년 ~ 2023년

단위 : %



• 자료출처 : 인하대병원 전자의무기록

항류마티스약제 중, 대표 약제인 메토트렉세이트는 심각한 독성이 드물어 우선적으로 사용되며, 주된 부작용으로 구강궤양, 오심, 간독성, 골수억제, 간질성 폐렴이 있습니다.

피부 증상, 위장관 증상, 골수억제 등 대부분의 부작용은 약제의 용량 및 엽산 결핍과 관련이 있으므로 약제 용량을 적절히 조절하고 엽산을 함께 복용하는 것이 중요합니다.